

**RECOMMANDATION FINALE du CCCEM
et
MOTIFS de la RECOMMANDATION**

**TRAVOPROST et MALÉATE DE TIMOLOL
(DuoTrav^{MC} gouttes ophtalmiques – Alcon Canada Inc.)**

Description :

Le collyre DuoTrav^{MC} renferme du travoprost et du maléate de timolol en quantités fixes; son usage est autorisé dans le traitement de la pression intraoculaire (PIO) élevée due au glaucome à angle ouvert ou de l'hypertonie intraoculaire lorsque la réponse thérapeutique aux bêta-bloquants, aux prostaglandines ou à d'autres médicaments abaissant la PIO est insuffisante et quand l'administration d'une association de médicaments en quantité déterminée est jugée appropriée.

Présentation :

DuoTrav^{MC} est un collyre renfermant 0,004 % de travoprost et 0,5 % de timolol.

Recommandation :

Le Comité consultatif canadien d'expertise sur les médicaments (CCCEM) recommande d'inscrire les gouttes ophtalmiques DuoTrav^{MC} sur la liste des médicaments couverts en usage restreint aux personnes présentant une réponse insuffisante aux bêta-bloquants ophtalmiques.

Motifs de la recommandation :

1. Le Comité a étudié deux essais cliniques comparatifs et randomisés d'une durée de trois mois qui comparent l'association médicamenteuse en quantité déterminée de travoprost à 0,004 % et de timolol à 0,5 %, administrée à raison d'une goutte par jour le matin, à l'administration concomitante de timolol 0,5 % (une goutte par jour le matin) et de travoprost 0,004 % (une goutte par jour le soir). L'un des essais examine un troisième comparateur, à savoir le timolol 0,5 % administré le matin et le soir. Tous les régimes thérapeutiques, y compris le timolol administré deux fois par jour, amènent une réduction d'importance clinique de la PIO comparativement à la valeur de référence. L'association de travoprost et de timolol, dans une formulation combinée ou en administration concomitante, produit une plus grande réduction de la PIO, de façon statistiquement significative, que le timolol seul.
2. Rien n'indique que l'incidence ou la nature des effets indésirables soient différentes entre l'association médicamenteuse en quantité déterminée et l'administration concomitante de chacun des deux médicaments.
3. Le coût mensuel de DuoTrav^{MC} est d'environ 20 \$, alors que celui des deux médicaments en administration concomitante est de 25 \$.

Programme commun d'évaluation des médicaments

À souligner :

1. Le Comité a tenu compte des données publiées et des données inédites sur le sujet avant de formuler sa recommandation.